

Trometamol

(ADDEX®-THAM)

Afleveringsvorm

Flacon met oplossing van 20 g trometamol per 50 ml (150 mmol trometamol) voor intraveneuze infusie.

Bereiden

De flacon van 50 ml aanvullen met 450 ml glucose 5%. Verwijder daartoe eerst de nodige hoeveelheid uit een verpakking van 500 ml glucose 5%. De eindconcentratie bedraagt 0.3 mmol/ml.

Bij snelle toediening (15 minuten; zie rubriek "Toedienen") is het aangewezen twee flacons aan te vullen met 400 ml glucose 5%. Verwijder daartoe eerst de nodige hoeveelheid uit een verpakking van 500 ml glucose 5%. De eindconcentratie bedraagt 0.6 mmol/ml.

Toedienen

Intraveneus als infuus: duur van de perfusie: niet minder dan 1 uur.

Indien een snellere toediening vereist is (15 minuten in acute situatie) is het aangewezen de 0.6 molaire oplossing te gebruiken (zie bereidingswijze hierboven).

Indien een dergelijke hoge dosis snel wordt gegeven, moet men een tussentijd van 12 uur in acht nemen eer een volgende dosis te geven.

Meestal wordt niet langer dan één dag behandeld, behalve in levensbedreigende situaties.

Een debiet van 5 mmol/kg/uur niet overschrijden.

Pediatrie: een totale dagdosis van 12 mmol/kg/dag niet overschrijden.

Volwassenen: een totale dagdosis 18 mmol/kg/dag niet overschrijden.

Infuusvloeistoffen

Glucose 10% (telkens twee flacons in 1L) en glucose 5% (zie bereidingswijze hierboven).

Onverenigbaar met

Geneesmiddelen die resulteren in een lage pH.

Acute reacties

In het geval van een respiratoire acidose treedt respiratoire depressie op en moet de patiënt adequaat geventileerd worden met een respiratoire behandeling. Bij metabole acidose is niet onmiddellijk respiratoire depressie te verwachten maar voorzichtigheid is geboden.

Bij hoge concentraties: verstoorde glycemie, hyperkaliemie, thromboflebitis.

Lokaal: vasculaire irritatie met spasmen en thrombose.

Extravasculaire infusie kan weefselnecrose geven.

Hepatische necrose bij boorlingen.

Bijzonderheden en bewaring

De oplossing moet binnen 1 uur voor gebruik aangemaakt worden.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met nierinsufficiëntie (kaliumspiegels en trometamine-excretie).

Bron: bijsluiter firma
16/04/2004, versie 1