

Amfotericine B

Abelcet®

Afleveringsvorm

Flacon met 100 mg amfotericine B suspensie voor infusievloeistof.

Bereiden

Laat de suspensie op kamertemperatuur komen. De injectieflacon moet goed geschud worden tot alle gele neerslag is opgelost. De gewenste dosis wordt uit het nodige aantal injectieflacons opgezogen met 20 ml steriele spuiten. De inhoud van de spuiten wordt d.m.v. een 5 micron filternaald die bij elke injectieflacon is bijgevoegd, geïnjecteerd in de infuuszak met 5% glucose. Let wel : een nieuwe filternaald moet gebruikt worden voor elke nieuwe spuit.

Het totaal volume bedraagt ongeveer 500ml., daartoe moet een volume gelijk aan dat van Abelcet eerst onttrokken worden aan de zak alvorens Abelcet erin te spuiten.

Toedieningsroute

Volwassenen

Intraveneus over 2 uur met een snelheid van 2,5mg/kg/uur.

Een initiële testdosis van 1 mg moet over een periode van 15 minuten intraveneus geïnfundeerd worden om potentiële anafylaxie te ontdekken.

Kinderen

Intraveneus over 2 uur met een snelheid van 2.5 mg/kg/uur.

Houdbaarheid

Onverdund : 15 uur bij 2 tot 8°C en 6 uur bij kamer temperatuur.

Infuusvloeistoffen

Glucose 5%

Onverenigbaar met

Abelcet mag niet verdund worden in zoutoplossingen noch gemengd worden met andere geneesmiddelen of electrolyten.

Bijzonderheden

In bijzondere situaties (pediatrische patiënten, patiënten met cardiovasculaire aandoeningen) kan het volume verminderd worden tot 250 ml.

Bijwerkingen

Rillingen, koorts, misselijkheid en braken.

Ongewenste bijwerkingen die gerapporteerd zijn in verband met conventioneel amfotericine B kunnen ook met Abelcet optreden.