

ACICLOVIR EG® 250 mg

Stofnaam	Aciclovirnatrium
Klasse	Infecties – Antivirale middelen – Middelen tegen herpesvirussen
Farmaceutische vorm	Poeder voor oplossing voor infusie

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|---------------|----------------------------|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | 10 ml water voor injecties |

Verder verdunnen met

- | | |
|---------------|---|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | NaCl 0,9 % OF glucose 5 % tot een eindconcentratie van max. 5 mg/ml |

Toedienen

- | | |
|---------------|---------------|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | trage infusie |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	3 jaar in oorspronkelijke verpakking bij 25°C
Na oplossen	onmiddellijk toedienen
Na verdunnen	onmiddellijk toedienen

Verenigbare infusen	NaCl 0,45 % en glucose 2,5 %, NaCl 0,18 % en glucose 4 %
----------------------------	--

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden

- Opletten bij verminderde nierfunctie: dosis verlagen + voldoende hydrateren.
- De onverdunde basisoplossing (25 mg/ml) kan m.b.v. een infusiepomp over 1u toegediend worden.
- pH = 11

Bronnen

1. SKP Aciclovir EG® (12/2013)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Handbook on Injectable Drugs (online)

(29/09/2015)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.