

ACTOSOLV® 600 000 IE

Stofnaam	urokinase
Klasse	Bloed en stolling – Antitrombotica – Trombolytica
Farmaceutische vorm	Poeder voor oplossing voor injectie/infusie.

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|---------------|---------------------------|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | 12 ml water voor injectie |
| ○ IV perfusie | 12 ml water voor injectie |

Verder verdunnen met

- | | |
|---------------|-------------------------|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | onverdund |
| ○ IV perfusie | NaCl 0,9% OF glucose 5% |

Toedienen

- | | |
|---------------|---|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | in loco bij getromboseerde centrale katheters |
| ○ IV perfusie | m.b.v. spuitenpomp |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	in koelkast (2 – 8°C)
Na oplossen	max. 12 uur bij 20°C
Na verdunnen	max. 24 uur op kamertemperatuur

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen NaCl 0,9%, glucose 5%

Onverenigbare infusen



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

ATC: B01AD04
CNK: 0290-189

Bijzonderheden

- In bepaalde gevallen kan de urokinase-injectie ook intra-arterieel toegediend worden.
- pH = 6 – 7,5

Bronnen

1. SKP Actosolv® (12/2015)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

(10/11/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.