

ADENOCOR® 6 mg/2 ml

Stofnaam Adenosine

Klasse Anti-aritmica bij supraventriculaire aritmieën

Farmaceutische vorm Oplossing voor injectie

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus Snelle injectie (1 à 2 seconden), onverdund rechtstreeks in de ader of via infuuslijn gevolgd door snel spoeling met NaCl 0,9%
- IV perfusie Infusie

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product 15 °C – 25 °C. Niet in de koelkast bewaren.
Restant van geopende flacon niet meer gebruiken.

Na oplossen NVT

Na verdunnen onmiddellijk gebruiken

Verenigbare infusen Hartmann, Ringerlactaat, glucose 5% in Ringer

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden

ECG monitoring tijdens toediening noodzakelijk.
Snelle toediening is belangrijk gezien korte plasma-
halfwaardetijd (minder dan 10 sec).
Bij gelijktijdig gebruik van dipyridamol dient de dosering van
adenosine sterk verlaagd te worden.

pH = 4.5 – 7.5

Bronnen

1. SKP Adenocor® (07/2013)
2. Handbook on injectable drugs (online, 18/03/2016)
3. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
4. Injectable Drugs Guide (2011)

(27/05/2016)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.