

POLIDOCAMOL

(AETHOXYSKLEROL[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 10 mg = 2 ml (5 mg/ml, 0,5%), 20 mg = 2 ml (10 mg/ml, 1 %), 40 mg = 2 ml (20 mg/ml, 2 %), 60 mg = 2 ml (30 mg/ml, 3 %) polidocanol
Flacon met 300 mg = 30 ml (10 mg/ml, 1 %) polidocanol

Toedienen

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund

Code voor toedienen

Categorie A

Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking
Flacon na aanprikken: 24 uur bij 4 °C

Bijzonderheden

- Bevat 5% alcohol.
- Extravasatie moet worden voorkomen, omdat dit blijvend littekens kan veroorzaken.
- Intra-arterieel toedienen moet worden voorkomen, omdat hierbij ernstige necrose van ledematen kan ontstaan.
- In een horizontaal of 30°-45° hoger liggend been injecteren, als schuim of middels de "air-block" techniek. Kleine varices worden met de 0,5%- of met de 1%-oplossing, middelgrote met de 2%-oplossing en grote met de 3%-oplossing behandeld.
- Maatregelen bij paraveneuze injectie: 5-20 ml NaCl 0,9% met hyaluronidase injecteren op de injectieplaats.
- Maatregelen bij intra-arteriële injectie: 5-10 ml lidocaine 1 of 2% en heparine 500 IE injecteren, been in watten hullen en naar beneden plaatsen.

Acute reacties

Pijnlijkheid op injectieplaats, anafylactische shock, orthostatische collaps.

Bijwerkingen

Irreversibele verkleuring van de injectieplaats, prutitus, necrose en ulceraties op de injectieplaats. Zelden: diep veneuze trombose, embolie