

ALBUMINE® 20 g/100 ml

Stofnaam Menselijk albumine

Klasse Plasmaderivaten en plasmaproteïnen

Farmaceutische vorm Oplossing voor infusie

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie onverdund toedienen of verdunnen met NaCl 0,9 OF glucose 5%

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie: Infusiesnelheid aanpassen aan individuele omstandigheden en indicatie. Onverdunde oplossing best toedienen aan een snelheid van 1 tot 3 ml/min. Bij plasma-uitwisseling infusiesnelheid aan passen aan verwijderingssnelheid. Altijd toedienen op kamer- of lichaamstemperatuur.

Houdbaarheid/Bewaarcondities

- Product** 2 °C - 8 °C, beschermen tegen licht.
- Na oplossen** NVT
- Na verdunnen** Gebruiken binnen de 3 uur na aanprikken.

Verenigbare infusen Isotone oplossingen

Onverenigbare infusen Niet isotone oplossingen

Bijzonderheden

Niet verdunnen met water voor injectie: risico op hemolyse.

pH = 6.4 – 7.4

Bronnen

1. SKP Albumine[®] (08/2014)
2. Handbook on Injectable Drugs (online)

(27/05/2016)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.