

AMUKIN® 100 mg/2 ml

Stofnaam	Amikacine sulfaat
Klasse	Antibacteriële middelen - aminoglycosiden
Farmaceutische vorm	Oplossing voor injectie

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NaCl 0,9% OF glucose 5%

Toedienen

- SC NVT
- IM rechtstreeks inspuiten
- IV bolus over 2 à 3 min.
- IV perfusie over 30 à 60 min.

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	kamertemperatuur
Na oplossen met	NVT
Na verdunnen met	24 u bij 30°C OF 30 dagen bij -15°C OF 60 dagen bij 4°C

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.
--

Verenigbare infusen glucose 10%, ringerlactaat, Hartmann

Onverenigbare infusen



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

CNK: 0832-659
ATC: J01GB06

Bijzonderheden

Irreversibele ototoxiciteit: serumspiegels goed opvolgen.
pH = 3,5 – 5,5

Bronnen

1. SKP Amukin® (07/2013)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

24/08/2015

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.