

APOMORPHINE HCl Sterop® 5 mg/1 ml

Stofnaam Apomorfine, hydrochloride

Klasse Zenuwstelsel – Antiparkinsonmiddelen – Dopamine-agonisten – Apomorfine

Farmaceutische vorm Oplossing voor injectie voor subcutaan gebruik

Bereiden

Oplossen met

- SC onverdund
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC onverdund
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Toedienen

- SC - Onderbroken toediening: start met een subcutane injectie van 1 mg (of 20 mcg/kg), dosering om de 30 min verhogen met 1 mg tot een deblokkerend effect wordt bereikt.

- Continue subcutane infusie: initieel debiet van 1 mg/uur dat wordt aangepast afhankelijk van de klinische resultaten.

Nooit meer dan 10 mg/24 uur toedienen

- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	Beschermen tegen licht. Na openen niet langer dan 24 uur bewaren.
Na oplossen met	NVT
Na verdunnen met	NVT

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen NaCl 0,9%

Onverenigbare infusen water voor injectie

Bijzonderheden pH = 3 - 4

Bronnen

1. SKP Apomorfine® (03/2014)
2. Handbook on Injectable Drugs (online, 27/05/2016)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

27/05/2016

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.