

CEFOTAXIM Sandoz® 2 g

Stofnaam cefotaxim (natrium)

Klasse Antibacteriële middelen – bèta-lactamantibiotica –
cefalosporines

Farmaceutische vorm Poeder voor oplossing voor injectie/infusie.

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus 10 ml water voor injectie
- IV perfusie - korte IV infusie: 10 ml water voor injectie OF 10 ml NaCl 0,9%
OF 10 ml glucose 5%
- lange IV infusie: 10 ml NaCl 0,9% OF 10 ml glucose 5%

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus onverdund
- IV perfusie - korte IV infusie: 40 – 50 ml water voor injecties
OF 40 – 50 ml NaCl 0,9% OF 40 – 50 ml glucose 5%
(exclusief oplosvolume)
- lange IV infusie: 100 ml NaCl 0,9% OF 100 ml glucose 5%

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus in een periode van 3-5 minuten
- IV perfusie - korte IV infusie: over 20 min.
- lange IV infusie: over 50 – 60 min.

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product beneden 25°C
Na oplossen met onmiddellijk gebruiken
Na verdunnen met onmiddellijk gebruiken

Verenigbare infusen glucose 5% in NaCl 0,9%, glucose 5% in NaCl 0,45%, Hartmann

Onverenigbare infusen natriumbicarbonaat

Bijzonderheden

Er bestaan kruisovergevoeligheid voor andere cefalosporines en penicillines.

Bij een zeer klein aantal patiënten die een snelle IV toediening kregen van cefotaxime via een centraal veneuze katheter is potentieel levensbedreigende aritmie gemeld.

pH = 5 – 7,5

Bronnen

1. SKP Cefotaxim Sandoz® (08/2014)
2. Handbook on Injectable Drugs (27/05/2016)
3. UCL Hospitals Injectables Medicines Administration Guide 3th Edition (2011)
4. Injectable Drugs Guide (2011)

(27/05/2016)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.