

CEFTRIAZONE Sandoz® 1 g

Stofnaam	Ceftriaxon (als dinatrium-3,5 H ₂ O)
Klasse	Antibacteriële middelen – Cefalosporines- Derde groep
Farmaceutische vorm	Poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM 3,5 ml Lidocaïne hydrochloride 1%
- IV bolus 10 ml water voor injecties
- IV perfusie 20-40 ml NaCl 0,9% OF 20-40 ml glucose 5%

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Toedienen

- SC NVT
- IM Diep intramusculair toedienen. Doseringen hoger dan 1 g moeten worden verdeeld en op verschillende plaatsen worden toegediend.
- IV bolus Toedienen over minstens 2 tot 4 min direct in een ader of langs de lijn van een intraveneus infuus.
- IV perfusie over minstens 30 minuten toedienen

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	kamertemperatuur
Na oplossen	24u in de koelkast (2-8°C)
Na verdunnen	geen informatie

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

Verenigbare infusen glucose 5% in NaCl 0,45%, glucose 5% in NaCl 0,9%

Onverenigbare infusen calciumhoudende IV-oplossingen, Ringer, Hartmann

Bijzonderheden

Doses van meer dan 2 g dienen IV gegeven te worden.

Indien als oplosmiddel lidocaïne werd gebruikt, mag de bereide oplossing nooit intraveneus worden toegediend.

Bij reconstitutie wordt een lichtgele tot amberkleurige oplossing verkregen.

pH = 6 - 8

Bronnen

1. SKP Ceftriaxone Sandoz (11/2014)
2. Handbook of injectable medicines (online, 20/03/2016)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

(20/03/2016)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

CNK 0778-563
ATCJ01DD04

aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.