

CIPROFLOXACINE Fresenius Kabi® 200 mg/100 ml

Stofnaam ciprofloxacin

Klasse Antibacteriële middelen - chinolonen - fluorochinolonen

Farmaceutische vorm oplossing voor infusie

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie onverdund; 200 mg over 30 min., voor kinderen steeds over 60 min.

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product kamertemperatuur (15-25°C), beschermen tegen licht; neerslag bij koele bewaartemperatuur lost terug op bij kamertemperatuur; na aanprikken 24u houdbaar beneden 25°C.

Na oplossen NVT

Na verdunnen NVT

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

Verenigbare infusen glucose 10%, glucose 5% in NaCl 0,9%, glucose 5% in NaCl 0,45%, Hartmann, Ringer, Ringerlactaat

Onverenigbare infusen natriumbicarbonaat

Bijzonderheden

pH = 3,5 – 4,5

Bronnen

1. SKP Ciprofloxacin Fresenius Kabi® (05/2014)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Handbook on Injectable Medicines (online)
4. Injectable Drugs Guide (2011)

(22/03/2016)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.