

GRAFALON® 100 mg/5 ml

Stofnaam	immunoglobulinen, anti-T-lymfocyten (konijnserum)
Klasse	Immunitet – Immunomodulatoren – Immunosuppressiva bij transplantatie – Antilymfocyttaire immunoglobulinen
Farmaceutische vorm	Concentraat voor oplossing voor infusie.

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|---------------|-----|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | NVT |

Verder verdunnen met

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | NaCl 0,9% (verdunningsverhouding 1:7) |

Toedienen

- | | |
|---------------|--|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | <ul style="list-style-type: none"> - transplantatie vast orgaan: over 4 uur - stamceltransplantatie: over 4 tot 12 uur - intraoperatieve toediening: over 0,5 tot 2 uur |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	koelkast (2 – 8°C), beschermen tegen licht
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	24 uur op kamertemperatuur

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen NVT

Onverenigbare infusen NVT

Bijzonderheden

- pH = 3,7 ($\pm$ 0,3)
- Eerste dosis met verlaagde infusiesnelheid toedienen tijdens eerste 30 minuten. Als geen symptomen van intolerantie optreden kan infusiesnelheid worden verhoogd.
- Toediening via centraal veneuze catheter of een perifere grote ader met hoge stroomsnelheid.

Bronnen

1. SKP Grafalon® (04/2016)

(30/05/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.