

HALDOL® 5 mg/5 ml

Stofnaam Haloperidol

Klasse Zenuwstelsel – Antipsychotica – Butyrofenonen

Farmaceutische vorm Oplossing voor injectie.

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|---------------|-----|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | NVT |

Verder verdunnen met

- | | |
|---------------|--|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | onverdund |
| ○ IV bolus | off-label: onverdund |
| ○ IV perfusie | off-label: glucose 5% (concentratie-interval: 0,5 mg tot 25 mg per 100 ml) |

Toedienen

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | langzaam inspuiten |
| ○ IV bolus | off-label: langzaam, 5 mg/min |
| ○ IV perfusie | off-label: met behulp van spuitpomp |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product Kamertemperatuur, na openen direct gebruiken.

Na oplossen NVT

Na verdunnen 24u indien bewaard bij 2 – 8°C; maximaal 12u indien bewaard bij kamertemperatuur (8 – 25°C), buiten invloed van licht.

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen glucose 5%, glucose/NaCl

Onverenigbare infusen NaCl 0,9%

Bijzonderheden

- pH = 2,8 – 3,6
- intraveneuze toediening (off label):
 - langzaam in bolus toe te dienen (max. 5 mg/min)
OF
 - verdund in glucose 5% (conc: 0,5 – 25 mg/100 ml)
toe te dienen m.b.v. spuitpomp

Bronnen

1. SKP Haldol® (11/07/2017)
2. Parenteralia (28/01/2014)

(11/07/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.