Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

ATC: B03AC01
CNK: 2730-281

INJECTAFER® 100 mg/2 ml

Stofnaam Ijzer(III)carboxymaltose

Klasse Mineralen en vitaminen – Mineralen – Ijzer – Parenterale preparaten

Farmaceutische vorm Oplossing voor injectie/ infusie.

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus onverdund
- IV perfusie NaCl 0,9%
  Minimum conc.: 2 mg ijzer/ml

Benodigd volume Injectafer			Equivalente ijzerdosis			Maximale hoeveelheid steriele 0,9% m/V natriumchloride-oplossing
2	tot	4 ml	100	tot	200 mg	50 ml
> 4	tot	10 ml	> 200	tot	500 mg	100 ml
> 10	tot	20 ml	> 500	tot	1.000 mg	250 ml

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus

Benodigd volume Injectafer			Equivalente ijzerdosis			Toedieningssnelheid/minimale toedieningstijd
2	tot	4 ml	100	tot	200 mg	Geen minimale voorgeschreven tijd
>4	tot	10 ml	>200	tot	500 mg	100 mg ijzer/min.
>10	tot	20 ml	>500	tot	1.000 mg	15 minuten

- IV perfusie 100 ml over minimum 6 minuten, 250 ml over minimum 15 minuten

Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	Kamertemperatuur, beschermend tegen licht. Niet bewaren boven 30°C. Niet in de vriezer bewaren.
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	Onmiddellijk gebruiken

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

Verenigbare infusen

NaCl 0,9%

Onverenigbare infusen

Alle andere infuusoplossingen die hierboven niet vermeld worden.

Bijzonderheden

- Voorzieningen voor reanimatie moeten direct beschikbaar zijn
- Parenteraal toegediende ijzerpreparaten kunnen overgevoeligheidsreacties veroorzaken, waaronder ernstige en mogelijk fatale anafylactische reacties. Patiënten moeten nauwlettend worden gecontroleerd op klachten en symptomen van overgevoeligheidsreacties: patiënt gedurende minstens 30 min na injectie observeren
- Bij hemodialysepatiënten onverdund toedienen in veneuze tak van het dialysepreparaat

Bronnen

1. SKP Injectafer® (03/2017)

(18/10/2017)

DISCLAIMER
Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.