

LEVOFLOXACINE Mylan® 500 mg/100 ml

Stofnaam	Levofloxacin
Klasse	Infecties – Antibacteriële middelen – Chinolonen – Levofloxacin
Farmaceutische vorm	Oplossing voor infusie.

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie onverdund OF NaCl 0,9% OF glucose 5%

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie minstens 30 min. voor 250 mg OF 60 min. voor 500 mg

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	Bewaren in buitenverpakking. Na verwijderen van buitenverpakking: 24u houdbaar (o.i.v. licht).
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	Indien beschermd tegen licht: 8 u bij 25 °C. Gedurende infusietijd is bescherming tegen licht niet nodig.

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

Verenigbare infusen	NaCl 0,9%, glucose 5%
Onverenigbare infusen	Heparine of basische oplossingen (bv waterstofcarbonaat)

Bijzonderheden

- pH = 4,3 – 5,3
- osmolaliteit: tussen 280 en 320 mOsm/kg
- Aangezien de parenterale en de orale vorm bio-equivalent, kan dezelfde dosering worden aangehouden.
- De patiënt niet onnodig blootstellen aan fel zonlicht of aan kunstmatige UV straling om fotosensibilisatie te voorkomen.

Bronnen

1. SKP Levofloxacin Mylan® (06/2016)

(31/01/2018)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.