

LEVOPHED® 8 mg/4 ml

Stofnaam norepinefrine, waterstoftartraat
(= noradrenaline, waterstoftartraat)
elke 4 ml amp. bevat 8 mg noradrenalinetartraat of 4 mg
noradrenaline base

Klasse Cardiovasculair stelsel – Hypotensie – Middelen bij acute
hypotensie

Farmaceutische vorm Oplossing voor injectie.

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 1 liter glucose 5%
OF 1 liter NaCl/glucose (glucose beschermt de L-
noradrenaline tegen oxidatie).

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie Start: 2 – 3 ml verdunde oplossing per minuut (8 – 12
mcg/min.).
Nadien 0,5 – 1 ml verdunde oplossing per minuut i.f.v.
cardiovasculaire toestand van de patiënt.

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product < 25 °C, beschermd van licht
Na oplossen NVT
Na verdunnen 24 uur

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen NaCl 0,9%, glucose 5%, Ringerlactaat

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden

- pH = 3 – 4,5
- Het verdient de voorkeur om een ader in de elleboogplooï te gebruiken en deze van de onderste ledematen te vermijden.
- De bloeddruk moet om de 2 minuten gecontroleerd worden bij het begin van de infusie, vervolgens om de 5 minuten.
- Bij paraveneuze injectie moeten de aangetaste zones geïnfiltreerd worden met fentolaminemesilaat.

Bronnen

1. SKP Levophed® (01/2017)
2. Handbook on Injectable Drugs (online)

(07/07/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.