

NEGABAN® 1 g

Stofnaam	Temocilline (dinatrium)
Klasse	Injecties – Antibacteriële middelen – Bèta-lactamantibiotica – Penicillines – Carboxypenicillines
Farmaceutische vorm	poeder voor oplossing voor injectie

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM 3 ml water voor injectie OF 3 ml NaCl 0,9 % OF 3 ml
lidocaïneoplossing 0,5 % - 1 %
- IV bolus 10 ml water voor injectie OF 10 ml NaCl 0,9 %
- IV perfusie 10 ml water voor injectie OF 10 ml NaCl 0,9 % OF 10 ml
glucose 5 %

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 50 – 150 ml water voor injectie OF 50 – 150 ml NaCl 0,9% OF
50 – 150 ml glucose 5%

Toedienen

- SC NVT
- IM diepe injectie in een belangrijke spier
- IV bolus langzame injectie in een ader over 3 – 4 min.
- IV perfusie over 30 – 40 min.

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	koelkast (2 – 8°C)
Na oplossen	24 u op kamertemperatuur (25°C)
Na verdunnen	24 u op kamertemperatuur (25°C)

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

Verenigbare infusen glucose 10%, Ringer, Hartmann, sorbitol, natriumlactaat M/6

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden

- Enkel tot 2 g via IM-weg.
- Oplossing van 0,5 – 1% lidocaïne mag niet IV toegediend worden.
- pH = 6 – 8.5

Bronnen

1. SKP Negaban® (05/2017)
2. Stabilis.org (online, 4/12/2015)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

(8/09/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.