

NIMOTOP® 10 mg/50 ml

Stofnaam	nimodipine
Klasse	Cardiovasculair stelsel – Calciumantagonisten – Dihydropyridines
Farmaceutische vorm	Heldere oplossing voor intraveneuze infusie.

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT
- intracisternaal NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie m.b.v. een driewegkraan wordt Nimotop® toegediend met een co-infuus (glucose 5% OF NaCl 0,9%) in verhouding 1:4.
- intracisternaal 19 ml Ringer-oplossing

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie Via een centrale katheter met infuuspomp. De eerste 2 uur aan max. 5 ml/uur. Indien goed verdragen na 2 uur: ophogen naar 10 ml/uur. Bescherm de infusie van zonlicht.
- intracisternaal op lichaamstemperatuur toedienen

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	Beschermen t.o.v. licht. Indien in licht bewaard: 10 uur houdbaar. Wanneer aangeprikt: binnen de 24 uur toedienen.
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	NVT

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen Ringer lactaat, mannitol

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden

- Het actieve bestanddeel van Nimotop® wordt geabsorbeerd door PVC. Daarom wordt aanbevolen PE infuusslangen – recipiënten te gebruiken.
- pH = 6 – 7,5

Bronnen

1. SKP Nimotop® (11/2014)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)

(07/07/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.