

NOXAFIL® 300 mg/16,7 ml

Stofnaam Posaconazol

Klasse Infecties – Antimycotica – Azoolderivaten

Farmaceutische vorm Concentraat voor oplossing voor infusie

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 250 ml glucose 5% OF 250 ml NaCl 0,9%

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie
 - centrale veneuze lijn (PICC of centraal veneuze katheter): 90 min (voorkeur)
 - perifere veneuze katheter: 30 min (kans op infusieplaatsreactie beperken)

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product bewaren in de koelkast (2°C – 8°C)
Na oplossen NVT
Na verdunnen 24 uur bij 2°C – 8°C

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

Verenigbare infusen NaCl 0,45%, glucose 5% in NaCl 0,9%, glucose 5% in NaCl 0,45%

Onverenigbare infusen Ringerlactaat, glucose 5% in Ringerlactaat, natriumbicarbonaat

Bijzonderheden

Meervoudige perifere infusies toegediend via dezelfde ader kunnen leiden tot infusieplaatsreacties (oedeem, pijn, flebitis).

pH = 2,6

Bronnen

1. SKP Noxafil® (07/2015)
2. Handbook on Injectable Drugs (online, 21/05/2017)

(21/05/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.