

PEYONA® 20 mg/ml

Stofnaam	coffeïne, citraat
Klasse	Ademhalingsstelsel – Diverse geneesmiddelen bij respiratoire aandoeningen – Respiratoire analeptica – Coffeïne
Farmaceutische vorm	Oplossing voor infusie.

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| ☐ SC | NVT |
| ☐ IM | NVT |
| ☐ IV bolus | NVT |
| ☐ IV perfusie | NVT |

Verder verdunnen met

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ SC | NVT |
| ☐ IM | NVT |
| ☐ IV bolus | NVT |
| ☐ IV perfusie | onverdund OF NaCl 0,9% OF glucose 5% |

Toedienen

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ☐ SC | NVT |
| ☐ IM | NVT |
| ☐ IV bolus | NVT |
| ☐ IV perfusie | oplaaddosis (1 ml/kg) over 30 min.
onderhoudsdosis (0,25 – 1 ml/kg) over 10 min.
onderhoudsdosis starten 24 uur na oplaaddosis |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	kamertemperatuur
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	24 uur bij 25°C

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen calciumgluconaat 10%

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden

- Orale toediening is mogelijk.

Bronnen

1. SKP Peyona® (07/2009)

(26/04/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.