Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

CNK: 0793-646
ATC: J01CR05

PIPERACILLINE/TAZOBACTAM Sandoz® 4 g/500 mg

Stofnaam Piperacilline (natrium) + tazobactam (natrium)

Klasse Infecties – antibacteriële middelen – beta-lactamantibiotica - penicillines – acylureïdopenicillines

Farmaceutische vorm Poeder voor oplossing voor infusie

Bereiden

Oplossen met

- SC: NVT
- IM: NVT
- IV bolus: NVT
- IV perfusie: 20 ml NaCl 0,9% OF 20 ml water voor injectie OF 20 ml glucose 5%

Verder verdunnen met

- SC: NVT
- IM: NVT
- IV bolus: NVT
- IV perfusie: NaCl 0,9% OF water voor injectie OF glucose 5% tot gewenst volume (bv: 50 ml tot 150 ml)

Toedienen

- SC: NVT
- IM: NVT
- IV bolus: NVT
- IV perfusie: 30 minuten

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product beneden 25°C
Na oplossen 24 uur bij 25°C OF 48 uur bij 2 – 8°C
Na verdunnen 24 uur bij 25°C OF 48 uur bij 2 – 8°C

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen glucose 5% in NaCl 0,9%

Onverenigbare infusen Ringerlactaat, Hartmann, natriumbicarbonaat

Bijzonderheden

- Hypersensitiviteit, hypotensie, tromboflebitis
- pH = 5.7
- Beta-lactam antibiotica inactiveren aminoglycosiden.

Bronnen

1. SKP Piperacilline/Tazobactam Sandoz® (05/2014)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (thirth edition, 2010)
3. Injectable Drugs Guide (2011)
4. Handbook on Injectable Drugs (online, 23/08/2015)

(23/08/2015)

DISCLAIMER
Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.