

PROTAMINE SULFAAT Leo® 7000 IE/5 ml (= 50 mg/5 ml)

Stofnaam protamine sulfaat

Klasse Diverse geneesmiddelen – Antidota en chelatoren – Antidota bij geneesmiddelenintoxicatie – Protamine als antidotum van heparine

Farmaceutische vorm Oplossing voor injectie en infusie.

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NaCl 0,9% OF glucose 5%

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus Langzame injectie over ongeveer 10 minuten. Max. 5 ml per bolus toedienen.
- IV perfusie m.b.v. spuitpomp of volumetrische pomp

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product Kamertemperatuur. Na openen onmiddellijk gebruiken.
Na oplossen NVT
Na verdunnen onmiddellijk gebruiken

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen NVT

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden

- pH = 6 – 7
- De dosis protamine wordt idealiter geleid door bloedcoagulatie testen. Deze worden doorgaans 5 tot 15 min. na het toedienen van protamine sulfaat uitgevoerd.

Bronnen

1. SKP Protamine sulfaat® (11/2014)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Handbook on Injectable Drugs (online)

(20/12/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.