

ROBINUL® 0,2 mg/1 ml

Stofnaam glycopyrronium bromide

Klasse Anesthesie – Algemene anesthesie - Anticholinergica in de anesthesie

Farmaceutische vorm Oplossing voor injectie.

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|---------------|-----|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | NVT |

Verder verdunnen met

- | | |
|---------------|-----------|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | onverdund |
| ○ IV bolus | onverdund |
| ○ IV perfusie | NVT |

Toedienen

- | | |
|---------------|-------------------------|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | onverdund |
| ○ IV bolus | onverdund over 1 minuut |
| ○ IV perfusie | NVT |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	kamertemperatuur
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	NVT

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen

Onverenigbare infusen



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

ATC: A03AB02
CNK: 0855-031

Bijzonderheden

- Glycopyrronium bromide kan ook via SC-infusie toegediend worden in de palliatieve zorgen ter vermindering van respiratoire secreties en ter behandeling van darmkolieken (off label use).
- Bijwerkingen: droogheid van de mond, mictiestoornissen, accommodatiestoornissen, tachycardie, palpitaties, afwezigheid van zweetsecreties, ...
- pH = 2 - 3

Bronnen

1. SKP Robinul® (10/2015)
2. Injectable Drugs Guide (2011)

(10/11/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.