

ROCEPHINE® 1 g + 3,5 ml solv.

Stofnaam	dinatriumceftriaxon 3,5 H ₂ O
Klasse	Antibacteriële middelen – Cefalosporines – Derde groep

Farmaceutische vorm Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor IM injectie.

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ SC | NVT |
| ☐ IM | 3,5 ml lidocaïne hydrochloride 1% |
| ☐ IV bolus | NVT |
| ☐ IV perfusie | NVT |

Verder verdunnen met

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| ☐ SC | NVT |
| ☐ IM | NVT |
| ☐ IV bolus | NVT |
| ☐ IV perfusie | NVT |

Toedienen

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ SC | NVT |
| ☐ IM | Diepe intramusculaire injectie in het binnenste van een relatief grote spier. Per injectieplaats mag maximum 1 g worden geïnjecteerd. |
| ☐ IV bolus | NVT |
| ☐ IV perfusie | NVT |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	beneden 30°C in de oorspronkelijke verpakking
Na oplossen	6 uur bij kamertemperatuur (< 25°C) OF 24 uur bij 2 – 8°C
Na verdunnen	NVT

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

Verenigbare infusen glucose 5% in NaCl 0,45%, glucose 5% in NaCl 0,9%

Onverenigbare infusen calciumhoudende IV-oplossingen, Ringer, Hartmann

Bijzonderheden Bij gebruik van lidocaïneoplossing als oplosmiddel, mag de verkregen oplossing nooit intraveneus worden toegediend.

pH = 6 - 8

Bronnen

1. SKP Rocephine (09/2015)
2. Handbook of injectable medicines (online, 20/03/2016)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

(20/03/2016)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.