

SANDIMMUN® 250 mg/5 ml

Stofnaam	Ciclosporine
Klasse	Immuniteit - Immunomodulatoren - Immunosuppressiva na transplantatie

Farmaceutische vorm Concentraat voor oplossing voor infusie.

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NaCl 0,9% OF glucose 5% (1/20 tot 1/100 verdunning)

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie over 2 – 6 uur

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	bewaren onder 25°C beschermd van licht
Na oplossen	direct gebruiken
Na verdunnen	24 u bij 2 – 8 °C

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.
--

Verenigbare infusen NaCl 0,9%, glucose 5%

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden

Hulpstoffen aanwezig in Sandimmun® kunnen ftalaten losweken uit PVC. Indien mogelijk moeten dus glazen flessen gebruikt worden voor infusie. Containers en stoppen mogen geen siliconenolie of vetstoffen bevatten.

Kan anafylactische reacties veroorzaken.

pH = 6 - 7

Bronnen

1. SKP Sandimmun® (07/2015)
2. Handbook on Injectable Drugs (online, 28/04/2016)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

(28/04/16)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.