

TARADYL® 10 mg/1 ml

Stofnaam Ketorolac, trometamol

Klasse Osteo-articulaire aandoeningen – Niet-steroidale anti-inflammatoire middelen – Systemische toediening van NSAID's – Arylazijnzuurderivaten

Farmaceutische vorm Oplossing voor injectie.

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|---------------|-----|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | NVT |

Verder verdunnen met

- | | |
|---------------|-------------------------|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | NaCl 0,9% OF glucose 5% |

Toedienen

- | | |
|---------------|---------------------------|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | niet bepaald |
| ○ IV bolus | over minimum 15 seconden. |
| ○ IV perfusie | niet bepaald |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	kamertemperatuur (15 – 25°C) beschermd tegen licht
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	onmiddellijk gebruik

Verenigbare infusen glucose 5% in NaCl 0,9%, glucose 5% in NaCl 0,45%, Hartmann, Ringer, Plasmalyte

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden - pH = 6,9 – 7,9



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

CNK: 0398-677
ATC: M01AB15

Bronnen

1. SKP Taradyl® (04/2016)
2. Handbook on Injectable Drugs (online, 30/05/2017)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

(30/05/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.