

## TAVANIC® 500 mg/100 ml

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Stofnaam</b>            | Levofloxacin                                                    |
| <b>Klasse</b>              | Infecties – Antibacteriële middelen – Chinolonen – Levofloxacin |
| <b>Farmaceutische vorm</b> | Oplossing voor infusie.                                         |

### Bereiden

#### Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

#### Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie onverdund OF NaCl 0,9% OF glucose 5%

### Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie Minstens 30 min. voor 250 mg OF 60 min. voor 500 mg.

### Houdbaarheid/Bewaarcondities

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>      | Bewaren in buitenverpakking. Na verwijderen van buitenverpakking: 24u houdbaar (o.i.v. licht)             |
| <b>Na oplossen</b>  | NVT                                                                                                       |
| <b>Na verdunnen</b> | Indien beschermd tegen licht: 8 u bij 25 °C. Gedurende infusietijd is bescherming tegen licht niet nodig. |

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Verenigbare infusen</b>   | NaCl 0.9%, glucose 5%                                    |
| <b>Onverenigbare infusen</b> | Heparine of basische oplossingen (bv waterstofcarbonaat) |



Vlaamse Vereniging van  
Ziekenhuisapothekers

ATC: J01MA12  
CNK: 1445-204

### **Bijzonderheden**

- pH = 4,3 – 5,3
- osmolariteit: 282 – 322 mOsm/liter.
- Dit geneesmiddel bevat 7,8 mmol (181 mg) natrium per dosis van 50 ml en 15,8 mmol (363 mg) natrium per dosis van 100 ml.
- Aangezien de parenterale en de orale vorm bio-equivalent, kan dezelfde dosering worden aangehouden.
- De patiënt niet onnodig blootstellen aan fel zonlicht of aan kunstmatige UV straling om fotosensibilisatie te voorkomen.

### **Bronnen**

1. SKP Tavanic® (03/2016)

(31/01/2018)

---

#### **DISCLAIMER**

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.