

THYMOGLOBULINE® 25 mg + 5 ml solv.

Stofnaam	Immunoglobulinen, anti-T-lymfocyten (konijnserum)
Klasse	Immunitet – Immunomodulatoren – Immunosuppressiva bij transplantatie – Antilymfocyttaire immunoglobulinen

Farmaceutische vorm Poeder voor oplossing voor infusie.

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|---------------|--|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | 5 ml water voor injectie (bijgeleverd) |

Verder verdunnen met

- | | |
|---------------|--|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | NaCl 0,9% OF glucose 5%
totaal volume: 50 – 500 ml, gewoonlijk 50 ml per injectieflacon |

Toedienen

- | | |
|---------------|---------------------|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | over minstens 4 uur |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	koelkast (2 – 8°C), beschermend tegen licht
Na oplossen	onmiddellijk gebruiken
Na verdunnen	24 uur in koelkast (2 – 8°C)

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.
--

Verenigbare infusen

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden

- Tijdens transport zal temperatuur tot 25°C gedurende 3 dagen de productkenmerken niet wijzigen.
- Om onbedoelde toediening van deeltjes als gevolg van de reconstitutie te vermijden wordt aanbevolen dat Thymoglobuline® via een 0,2 µm in-line filter toegediend wordt.

Bronnen

1. SKP Thymoglobuline® (12-2015)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Handbook on Injectable Drugs (online)

(30/05/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.