

## VALPROATE Mylan® 1 g/10 ml

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stofnaam</b>            | natriumvalproaat                                                                  |
| <b>Klasse</b>              | Anti-epileptica – Anti-epileptica met breed spectrum - Valproïnezuur en valproaat |
| <b>Farmaceutische vorm</b> | Oplossing voor injectie.                                                          |

### Bereiden

#### Oplossen met

- |                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <input type="radio"/> SC          | NVT |
| <input type="radio"/> IM          | NVT |
| <input type="radio"/> IV bolus    | NVT |
| <input type="radio"/> IV perfusie | NVT |

#### Verder verdunnen met

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <input type="radio"/> SC          | NVT                     |
| <input type="radio"/> IM          | NVT                     |
| <input type="radio"/> IV bolus    | NVT                     |
| <input type="radio"/> IV perfusie | NaCl 0,9% OF glucose 5% |

### Toedienen

- |                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> SC          | NVT                                                           |
| <input type="radio"/> IM          | NVT                                                           |
| <input type="radio"/> IV bolus    | over 3 – 5 min. (10 mg/kg) m.b.v. filter (zie bijzonderheden) |
| <input type="radio"/> IV perfusie | m.b.v. filter (zie bijzonderheden)                            |

### Houdbaarheid/Bewaarcondities

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Product</b>      | beneden 25°C                 |
| <b>Na oplossen</b>  | NVT                          |
| <b>Na verdunnen</b> | 24u in de koelkast (2 – 8°C) |

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

**Verenigbare infusen** NaCl 0,9%, glucose 5%, Ringerlactaat

**Onverenigbare infusen**



Vlaamse Vereniging van  
Ziekenhuisapothekers

ATC: N03AG01  
CNK: 2363-588

### **Bijzonderheden**

- pH = 7,6
- Er dient bij elke intraveneuze toediening een filter gebruikt worden met poriegrootte max. 5mcm. Dit om te vermijden dat partikels met een diameter van meer dan 5 mcm worden geïnjecteerd.

### **Bronnen**

1. SKP Valproate Mylan® (01/2017)
2. Handbook on Injectable Drugs (online, 30/03/2017)

(31/03/2017)

---

#### **DISCLAIMER**

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.