

Linezolid

(ZYVOXID®)

Afleveringsvorm

Oplossing voor intraveneuze infusie van 2 mg/ml (600 mg/300 ml).

Bereiden

Gebruiksklare oplossing. Inspecteer de zakken op helderheid en lekkage.
Verwijder de omslag pas vlak voor het gebruik.
Enkel volledig afgesloten, heldere oplossingen zonder deeltjes gebruiken.

Toedienen

Intraveneus als infuus: duur van de perfusie: 30 tot 120 minuten.

Infuusvloeistoffen

Glucose 5% en 0,9% NaCl-oplossing.

Houdbaarheid

Eenmalig gebruik voor de duur van de perfusie.
Sluit gedeeltelijk gebruikte zakken niet opnieuw aan.

Onverenigbaar met

Gebruik deze infuuszakken niet in serieschakelingen. Tussen de geneesmiddeltoedieningen via dezelfde lijn, flushen met fysiologisch of glucose 5% naargelang het oplosmiddel van de andere toegediende medicatie via deze lijn.

Onverenigbaarheden: amfotericine B, chloorpromazinehydrochloride, diazepam, pentamidine-isethionaat, erythromycinelactobionaat, natriumfenytoïne, sulfamethoxazol/trimethoprim, natriumceftriaxone.

Acute reacties

Urticaria, rash... (> 0,1% en < 1%).
Ongeveer 22% van de patiënten ondervindt bijwerkingen.
Bijwerkingen waarvan de meest voorkomende: hoofdpijn, diarree, misselijkheid, braken, candidiasis en pijn op de insteekplaats.

Bijzonderheden

Kan enkel mits attestering door infectioloog worden voorgeschreven.
Linezolid en metabolieten gaan over in de moedermelk. Niet gebruiken bij de zwangerschap (tenzij het potentiële voordeel opweegt tegen het theoretische risico).

Bij behandeling van gecompliceerde infecties van de huid en de weke weefsels dient linezolid ALLEEN gebruikt te worden wanneer het microbiologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de infectie is veroorzaakt door Gram-positieve bacteriën.
Patiënten met gecompliceerde infecties van de huid en de weke weefsels waarvan men weet of vermoedt dat ze door Gram-positieve EN Gram-negatieve pathogenen zijn veroorzaakt, dienen alleen met linezolid te worden behandeld indien er geen therapeutisch alternatief is. In deze omstandigheden MOET gelijktijdig een behandeling tegen Gram-negatieve pathogenen worden opgestart.

Bron

Compendium 2003
17/05/2004, versie 1